

Guía de Práctica Clínica ERGE

Servicio de Aparato Digestivo
Hospital Clínico - Sector III

Basado en Recomendaciones SEMFYC, AEG & Cochrane

Síntomas abdominales
o retroesternales



Sugestivos de
reflujo



NO
Dispepsia
Otros

Si




Síntomas Leves




Síntomas > 2
semanas




Síntomas de
Alarma



Medidas higiénicas
Antisecretores
(IBP)



Tto empírico
Seguir algoritmo



- Disfagia.
- Anemia
- Pérdida de peso
- Sint respiratorios

Endoscopia
Seguir Algoritmo

Síntomas > 2 semanas
Síntomas leves que no mejoran

Tto empírico IBP 4 semanas

Control síntomas

No Control síntomas

Ensayo Retirada

Doblar dosis IBP 4 semanas

Asintomático

Control

No control

Si

No

Busqueda Dosis

Derivar

ENDOSCOPIA ORAL

```
graph TD; A[ENDOSCOPIA ORAL] --> B[Esofagitis grave]; A --> C["E. Barrett<br/>Estenosis"]; A --> D["Esofagitis leve<br/>o normal"]; A --> E[Otros]; B --> F["Derivar Especialista<br/>Consulta monográfica"]; C --> G["Tto IBP"]; D --> G; E --> H["Tto ó<br/>Derivar"];
```

The diagram is a flowchart starting with a central orange box labeled 'ENDOSCOPIA ORAL'. A thick teal arrow points down from this box to a horizontal green line. From this line, four teal arrows point down to four yellow boxes: 'Esofagitis grave', 'E. Barrett Estenosis', 'Esofagitis leve o normal', and 'Otros'. From 'Esofagitis grave', a teal arrow points down to an orange box containing 'Derivar Especialista' and 'Consulta monográfica'. From 'E. Barrett Estenosis', a teal arrow points down to an orange box containing 'Tto IBP'. From 'Esofagitis leve o normal', a teal arrow points down to the same 'Tto IBP' box. From 'Otros', a teal arrow points down to an orange box containing 'Tto ó' and 'Derivar'.

Esofagitis grave

E. Barrett
Estenosis

Esofagitis leve
o normal

Otros

Derivar Especialista
Consulta monográfica

Tto IBP

Tto ó
Derivar

Derivar a Especialista

- No control de síntomas
- Esofagitis Grave (Savary III-IV, Los Ángeles C y D)
- Esófago de Barrett
- Estenosis
- Otra patología

Endoscopia: Indicaciones

- **Presencia de síntomas de alarma**
 - Disfagia
 - Anemia,
 - Pérdida de peso,
 - Clínica respiratoria
- **Sintomatología grave y persistente**
- **Fracaso del tratamiento**
- **Evaluación preoperatoria**